



**Státní
veterinární
správa**

**Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Ústecký kraj**

Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem
T: +420 725 946 471

DOKLAD 11. 02. 2026		PRÍLOHY: 2
Č.J. 156/26/09VP		

Doručovací adresa:
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
El. adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



Č. j.: SVS/2026/025975
Vyřizuje: MVDr. Lenka Hanušová

Dle rozdělovníku

V Ústí nad Labem dne 10.02.2026

Informace obcím v souvislosti s výskytem pseudomoru drůbeže v malochovu v obci Drmaly

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracíme se na Vás v souvislosti s potvrzením nebezpečné nákazy – newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v obci Drmaly u ptáků chovaných v zajetí.

Popis nálezu: V malochovu drůbeže (kur domácí) v obci Drmaly bylo vysloveno podezření na nákazu. V chovu byla provedena kontrola a odebrány vzorky k laboratornímu vyšetření. Dne 9.2.2026 byl KVSU dodán výsledek vyšetření s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy – newcastleské choroby drůbeže. Dne 10.2.2026 byla veškerá drůbež utracena a provedena předběžná dezinfekce chovatelského zařízení.

Informujeme Vás, že v souvislosti s uvedeným ohniskem newcastleské choroby u volně žijícího ptáka a v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. g) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj (dále jen „KVSU“) **nezřizuje** kolem tohoto nálezu tzv. uzavřené pásmo (ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10 km).

Dovolujeme si Vás požádat o předání informace obyvatelům Vaší obce o tomto ohnisku newcastleské choroby a o doporučeních Státní veterinární správy. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících **30 dnech** se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné volní plochy, na kterých by se mohly vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva. Vakcinace je povinná v reprodukčních chovech kura domácího a v chovech nosnic s produkcí konzumních vajec s více než 500 kusy nosnic na hospodářství, avšak doporučujeme všem chovatelům ptáků zvážit vakcinaci svých zvířat nebo nakupovat drůbež již vakcinovanou od prověřených dodavatelů. Vakcinace je účinným nástrojem prevence, který pomáhá chránit zdraví ptáků a zároveň snižuje riziko šíření nákazy.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVSU, pracoviště Chomutov na tel.: 725 936 020 nebo pracoviště Žatec na tel.: 725 946 500, případně mimo pracovní dobu na pohotovostní linku 720 995 202 (max. do 22:00 hod).

Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezů zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali KVSU, pracoviště Chomutov na tel.: 725 936 020 nebo pracoviště Žatec na tel.: 725 946 500, případně mimo pracovní dobu na pohotovostní linku 720 995 202 (max. do 22:00 hod) a jednali pouze podle jejího pokynu.

S pozdravem

MVDr. Daniel Macháček
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Ústecký kraj
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Newcastle'ská choroba drůbeže
2. Mapa s katastry v okruhu 10 km od ohniska v Drmalech

Rozdělovník:

Obce s rozšířenou působností obdrží do datové schránky:

Magistrát města Chomutov,
Magistrát města Most,
Městský úřad Litvínov

Obce obdrží do datové schránky:

Bílence, Blatno, Boleboř, Brandov, Černovice, Droužkovice,
Hora Svaté Kateřiny, Horní Jirkov, Jiřetín, Kalek, Křimov, Malé Březno,
Nezabylice, Nová Ves v Horách, Otvice, Pesvice, Spořice,
Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všestudy, Vysoká Pec

Chovatelé do datové schránky:

VAIGL A SYN spol. s r.o.
Drůbež Červený hrádek s.r.o. - Červený Hrádek
Lukáš Stránský – Strupčice

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	MVDr. Daniel Macháček
Organizace:	Státní veterinární správa
Sériové č. cert.:	24182905
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	10.02.2026 14:31:31
Důvod:	Podpis dokumentu
Místo:	Ústí nad Labem

Newcastleská choroba drůbeže

Newcastleská choroba (NCD) neboli **Pseudomor drůbeže** je virové onemocnění vyvolané aviárním paramyxovirem sérotypu 1 (APMV-1), které se vyskytuje u domestikované drůbeže i u volně žijících ptáků. Patří mezi nebezpečné nákazy drůbeže a její výskyt má pro chovatele drůbeže značný ekonomický dopad. Onemocnění je charakterizováno gastrointestinálními, respiračními a nervovými příznaky, ztráty produkce a může způsobit i hromadné úhyny.

Newcastleská choroba postihuje kura domácího, onemocnět však mohou i krůty, pávi, bažanti, perličky, holubi, křepelky a koroptve. Kachny a husy jsou rovněž vnímavé, avšak onemocnění u těchto druhů se objevuje zřídka. Vnímaví jsou také pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků.

Ptačí paramyxoviry se dělí do 9 séro skupin (APMV 1-9) u drůbeže a PPMV u holubů. Většina sérotypů APMV se vyskytuje u volně žijících druhů ptáků, ale sérotypy APMV-2 a APMV-3 mohou způsobit respirační problémy a ztráty v produkci vajec v chovech drůbeže.

K přenosu infekce dochází přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a také nepřímo – kontaminovaným krmivem, vodou, pracovními pomůckami atd.

Newcastleská choroba je nebezpečná nákaza pro více jak 200 druhů ptáků, z nich nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí a papouškovití. Postižené hejno drůbeže se likviduje.

Klinické příznaky závisí na virulenci kmene:

- o náhlé nechutenství, náhlý pokles snášky, profúzní průjem, otoky hlavy, cyanóza hřebínku, postižení dýchacího traktu je doprovázeno typickými naříkavými zvuky doprovázejícími dýchání.
- o U vodní drůbeže, holubů a bažantů je průběh onemocnění pomalejší a dominují nervové příznaky.

Chovatelům drůbeže v ČR se doporučuje přijmout opatření, která minimalizují nebezpečí přenosu nákazy do chovu a která spočívají v těchto krocích:

- pravidelná vakcinace drůbeže proti newcastleské chorobě. Na trhu jsou dostupné inaktivované i živé atenuované vakcíny – vakcinace je povinná v reprodukčních chovech kura domácího a v chovech nosnic produkujících konzumní vejce s více než 500 ks nosnic,
- zákaz vstupu nepovolaným osobám do hal a chovů drůbeže,
- dodržování zoohygienických zásad v chovu,
- jednorázové naskladňování a vyskladňování turnusů,
- aktivace dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu,
- zasítování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal,
- u chovů, které jsou prováděné na výběhu, zamezit hlavně v podzimním období styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky, a to omezením výběhové chovu

nebo výstavbou zastřešených venkovních voliér, minimálně však zamezit kontaktu volně žijících ptáků s krmením a napájecí vodou pro drůbež,

- organizovat chov v uzavřených prostorách – halách a zamezit styku drůbeže s volně žijícím ptactvem,
- vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích, jak vyplývá z legislativy,
- pravidelně sledovat zdravotní stav (chování, kondici, příjem krmiva, tekutin, případně snášku),
- hlásit příslušné krajské veterinární správě státní veterinární správy (KVS SVS) nebo městské veterinární správě v Praze státní veterinární správy (MěVS SVS) zvýšené úhyny a hromadné úhyny drůbeže, v případě chovatelů, kteří chovají drůbež jako podnikatelé platí povinnost hlásit KVS SVS nebo MěVS SVS pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a hlásit zvýšenou úmrtnost o více než 3 % týdně
- při chovu v halách v době, kdy nebude mít drůbež přístup na výběh, je třeba pamatovat na zajištění dostatečného podestýlání, zajištění dostatečného krmného prostoru (krmítek) a napáječek. Rovněž je třeba dodržovat doporučené množství kusů drůbeže podle jednotlivých kategorií na jednotku prostoru a dbát na dostatečnou výměnu vzduchu zvýšeným větráním.

Mapa katastrů v okruhu 10 km kolem ohniska NCD v Drmotech



